

○ HYPOGLYCÉMIE : la glycémie est < 60 mg/dl

(l'affichage "Lo" sur le lecteur peut apparaître lorsque la glycémie est très basse)

○ Signes

Ce que vous pouvez remarquer : pâleur, yeux cernés, transpiration, comportement anormal (colère, fou rire inexplicable, inattention, pleurs, agressivité, excitation), somnolence, démarche titubante.



Ce que l'enfant peut ressentir : tremblements des membres supérieurs ou inférieurs, sensation de faim, mal de tête, vertiges, vue trouble, démarche titubante, fatigue.

○ Conduite à tenir

1. Faire asseoir l'enfant,
2. Faire une glycémie si possible (sinon donner d'emblée 1 sucre par 20 kg de poids) :
 - Si $40 < \text{glycémie} < 60$: donner 1 sucre/20Kg de poids ; soit..... sucre(s).
 - Si $\text{glycémie} < 40$: donner 2 sucres/20Kg de poids ; soit.....sucre(s).Parfois, il est nécessaire de resucrer l'enfant si $\text{glycémie} < 80$ car il présente déjà des signes.
Dans ce cas : donner $\frac{1}{2}$ sucre /20Kg de poids ; soit
3. Faire patienter l'enfant quelques instants assis.

○ **Si les signes persistent**, il faut redonner du sucre morceau par morceau , et cela autant de fois que nécessaire.

○ **Si l'hypoglycémie survient avant un repas**, il faut impérativement resucrer l'enfant en premier. Puis, dans un 2ème temps, lui faire l'injection et passer à table.

○ **Si l'hypoglycémie survient avant une collation**, il faut impérativement resucrer l'enfant en premier, puis lui donner sa collation.

○ **Si l'hypoglycémie survient à distance du repas ou de la collation**, il faut impérativement resucrer l'enfant en premier. **Pour l'enfant sous Insulatard et NPH** lui donner ensuite un biscuit (type "petit beurre"), ou un morceau de pain.